



دکتر صومی : مصرف مواد مخدر و اعتیاد به عنوان یکی از سه عامل مهم موثر در بروز انواع آسیب های اجتماعی -

دکتر صومی : مصرف مواد مخدر و اعتیاد به عنوان یکی از سه عامل مهم موثر در بروز انواع آسیب های اجتماعی

همایش راهکارهای فرهنگی و هنری پیشگیری از اعتیاد با حضور هنرمندان و اصحاب رسانه بیست و یکم آذرماه ساعت 18 در مجتمع باغلاز باغی تبریز به میزبانی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان&ZWNJ;شرقی برگزار گردید.

دکتر محمدحسین صومی دراین همایش گفت : با توجه به بند 4 سیاست های کلی مبارزه با مواد مخدر ابلاغی مقام معظم رهبری که در آن بند اتخاذ راهکارهای پیشگیرانه در مقابله با تهدیدات و آسیب های ناشی از مواد مخدر و روانگردان با بهره گیری از امکانات دولتی و غیردولتی با تاکید بر تقویت باورهای دینی مردم و اقدامات فرهنگی، هنری، ورزشی، آموزشی و تبلیغاتی در محیط خانواده، کار، آموزش و تربیت و مراکز فرهنگی و عمومی می باشد همت یکایک مسئولان شهر و صاحبان قلم و رسانه های جمعی را می طلبد تا این امر میسر گردد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی تبریز گفت : مصرف سیگار و قلیان، مواد مخدر و مشروبات الکلی به&ZWNJ;عنوان مثلث مهلک ابتلا به بسیاری از بیماری&ZWNJ;ها و نیز عامل کشنده و ناتوان&ZWNJ;کننده آحاد جامعه انسانی از بعد فردی، اجتماعی و فرهنگی است. بیماریهایی مانند : فشارخون بالا، حملات قلبی و مغزی، انواع سرطانها، اختلالات روانپزشکی و مشکلات اجتماعی مانند طلاق، سرقت، خشونت، بی بند باری های اخلاقی و...از جمله پیامدهای اعتیاد به حساب می آیند.

دکتر صومی اعلام کرد الگوی تولید و توزیع توتون و تنباکو در بازار تغییر یافته و تحت عنوان میوه&ZWNJ;ای در بازار عرضه می&ZWNJ;شود که متأسفانه 80 درصد محتویات آن&ZWNJ;ها مواد شیمیایی و اسانس&ZWNJ;ها هستند که عوارض مضاعفی را علاوه بر دود تنباکو بر سلامت مصرف&ZWNJ;کنندگان وارد می&ZWNJ;کند.

وی با اعلام اینکه مصرف سیگار و قلیان به عنوان یک ماده اعتیاد آور دروازه ای نقش کلیدی در بروز اعتیاد و انواع آسیب های اجتماعی دارد گفت مواد مخدر سومین تجارت پرسود بین&ZWNJ;المللی بعد از نفت و اسلحه می باشد . گرایش مالی عظیم این حوزه را از مخاطرات اصلی و مبارزه با صابان این بازار را متذکر شد.

استاد گوارش و کبد و رئیس دانشگاه علوم پزشکی تبریز همچنین در خصوص گرایش جوانان به روان گردان ها گفت : مصرف مواد روان&ZWNJ;گردان مانند محرک&ZWNJ;های شبه آمفتامینی در سال 2010 در جهان بین 14.3 تا 52.5 میلیون نفر(1/2-3/0درصد جمعیت 15-64 ساله) تخمین زده&ZWNJ;شده است . محرک&ZWNJ;های شبه آمفتامینی در سال&ZWNJ;های اخیر بعد از حبشیش دومین ماده پرمصرف در جهان بوده است و مقایسه نسبت کشفیات محرک&ZWNJ;های شبه آمفتامینی در ایران بین 2011 - 2010 در هرسال 400% افزایش داشته و این میزان افزایش کشفیات ایران را در مقام اول افزایش نسبی در مقایسه با 238% افزایش در مکزیک، 166% در تایلند، 153% در آمریکا و 140% در چین قرار داده است .

وی با اشاره به نقش خودمراقبتی و توانمندسازی آحاد جامعه ، همکاری هنرمندان ، اصحاب فرهنگ . هنر را در این حیطه خواستار شد و ضمن گزارشی از برگزاری کمپین نه ! به مصرف سیگار، قلیان، موادمخدر و مشروبات الکلی ، مشارکت جمعی را طریق نیل به اهداف کمپین برشمرد .

همایش راهکارهای فرهنگی و هنری پیشگیری از اعتیاد با همکاری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان&ZWNJ;شرقی و دبیرخانه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان و دانشگاه علوم پزشکی تبریز و انجمن&ZWNJ;های فرهنگی،&ZWNJ;هنری و ادبی استان و با حضور مسئولین و اصحاب هنر و ادب استان برگزار گردید .